

化膿性皮膚疾患用薬

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。**R・M軟膏**

R・M軟膏は、殺菌作用を持つアクリノールを、皮膚病巣面の水性分泌物を吸収排除するマクロゴール軟膏に練合した、外傷、靴ずれ、火傷、腫物、にきび、あせも、とびひ、湿疹、ただれに用いる外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意**相談すること**

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
 - (6) 深い傷やひどいやけどの人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

外傷、靴ずれ、火傷、腫物、にきび、あせも、とびひ、湿疹、ただれ

成分と作用

100 g 中に次の成分を含んでいます。

成 分	100 g 中	作 用
アクリノール、微末	0.1 g	殺菌作用を発揮します。
マクロゴール軟膏	適 量	基剤。

用法・用量

適宜、患部に塗布するか、又はガーゼ等に展延し、患部に貼布します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 衣類に付着すると着色し、脱色しにくいので注意してください。

■お問い合わせ先

製造販売元

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
3. 小児の手の届かない所に保管してください。