

化膿性皮膚疾患用薬

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

アクリノール・亜鉛華軟膏

アクリノール・亜鉛華軟膏は、殺菌作用を持つアクリノールを、局所の收れん・保護・緩和剤として皮膚疾患に広く用いられる亜鉛華軟膏に練合した外皮用薬です。

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 潤滑やただれのひどい人。
 - (6) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

湿疹・皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、やけどによる潮紅

成分と作用

100 g 中に次の成分を含んでいます。

成 分	100 g 中	作 用
アクリノール、微末	1.0 g	殺菌作用を発揮します。
亜鉛華軟膏	99.0 g	收れん、保護作用を発揮します。

用法・用量

ガーゼ等に展延し、患部に貼布するか、又は適宜、患部に塗布します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 衣類に付着すると着色し、脱色しにくいのでご注意ください。

■お問い合わせ先

製造販売元

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
3. 小児の手の届かない所に保管してください。