

湿疹・皮膚炎用薬（副腎皮質ホルモン含有製剤）

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

コーチ・C・P・V軟膏

コーチ・C・P・V軟膏は、抗炎症・抗アレルギー・鎮痒作用のあるヒドロコルチゾン酢酸エステルに鎮痒作用のあるクロタミトンを加え、ゲル化炭化水素と白色ワセリンに練合した、湿疹・皮膚炎、ただれ、かぶれに用いる外用薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないでください
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 乳幼児。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 患部が広範囲の人。
 - (8) 湿潤やただれのひどい人。
 - (9) 患部が顔面の人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

湿疹・皮膚炎、ただれ、かぶれ

成分と作用

100 g 中に次の成分を含んでいます。

成 分	100 g 中	作 用
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5 g	抗炎症作用、抗アレルギー作用、鎮痒作用を発揮します。
クロタミトン	5.0 g	かゆみをしずめます。
ゲル化炭化水素	50 g	基剤。
白色ワセリン	適 量	基剤。

用法・用量

適宜、患部に塗布します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

■お問い合わせ先

製造販売元

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】**注意**

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
4. 小児の手の届かない所に保管してください。