

皮膚軟化・ひび・あかぎれ・しもやけ用薬

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

ステアリン酸・グリセリンクリーム

ステアリン酸・グリセリンクリームは、ひび、あかぎれやしもやけに用いるため、皮膚の軟化と潤いを保たせるグリセリンを、ステアリン酸、カカオ脂やサラシミツロウ等とともに、クリーム状とした外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

 - 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

ひび、あかぎれ、しもやけ

成分と作用

100 g 中に次の成分を含んでいます。

成 分	100 g 中	作 用
ステアリン酸	10.0 g	基剤.
グリセリン	16.0 g	保湿剤.
カカオ脂	2.0 g	基剤.
流動パラフィン	1.0 g	基剤.
サラシミツロウ	1.0 g	基剤.
トリエタノールアミン	4.0 g	乳化剤.
精製水	適 量	溶剤.

用法・用量

適宜、患部に塗布します。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

■お問い合わせ先

製造販売元

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
3. 小児の手の届かない所に保管してください。