

みずむし・たむし用薬

この説明書は本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

サリチ・V軟膏

サリチ・V軟膏は、防腐力と角質軟化作用を持つサリチル酸を白色ワセリンに練合した、みずむし・たむしに用いる外皮用薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膈等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。
- (4) 化膿している部位。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 乳幼児。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
 - (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

成分と作用

100 g 中に次の成分を含んでいます。

成 分	100 g 中	作 用
サリチル酸	5.0 g	殺菌、防腐、鎮痒、角質軟化作用を発揮します。
白色ワセリン	適 量	基剤。

用法・用量

適宜、患部に塗布します。ただし、小児は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

■お問い合わせ先

製造販売元

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】

注意

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膈等）、陰のう、外陰部等。
 - (2) 湿疹。
 - (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。
 - (4) 化膿している部位。
2. 使用に際しては、説明文書をよく読んでください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
4. 小児の手の届かない所に保管してください。